

## การรักษา

ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกๆ การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดี แต่ถ้าเป็นระยะที่มะเร็งลุกลามมากแล้ว จะใช้รังสีรักษา โดยการฉายแสงร่วมกับการใส่แร่ หรือการผสมผสานระหว่างการผ่าตัด รังสีรักษาและการให้ยาเคมีบำบัด

## การป้องกัน

- ▶ มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันสมควร คือ หลังอายุ 20 ปี
- ▶ หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่แน่ใจควรใช้ถุงยางอนามัย
- ▶ เมื่อมีอาการตกขาวผิดปกติหรือเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรไปพบแพทย์
- ▶ สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจ Pap Smear เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละครั้ง

พิมพ์ครั้งที่ 4 จำนวน 30,000 แผ่น


พิมพ์ที่โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) พ.ศ. 2545

# มะเร็ง ปากมดลูก



สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข

# มะเร็งปากมดลูก



ปากมดลูก

- ▼ เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย และพบมากในช่วงอายุ 35-60 ปี
- ▼ มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่ป้องกันได้ แพทย์สามารถตรวจหา “ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก” ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ
- ▼ วิธีการที่ใช้ตรวจหา ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก เรียกว่าการตรวจหา “แปปสเมียร์” (Pap Smear)
- ▼ Pap Smear คือการเก็บเอาเซลล์เยื่อบริเวณปากมดลูก ไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง

# สตรีที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก

- ▼ มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย (ต่ำกว่า 20 ปี)
- ▼ มีคู่ว้มเพศสัมพันธ์หลายคน
- ▼ มีการอักเสบของปากมดลูกเนื่องจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus
- ▼ สตรีที่สูบบุหรี่มีโอกาสร้อยต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่

## อาการ

- ▼ **ระยะแรก** จะไม่ปรากฏอาการใดๆ แต่ตรวจพบได้จากการทำ Pap Smear
- ▼ **ระยะลุกลาม** จะมีอาการตกขาวมีกลิ่น มีเลือดออกทางช่องคลอด หรือตกขาวลักษณะคล้ายน้ำคาวปลา ถ้าเป็นมากอาจถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือมีอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายอุจจาระได้ นอกจากนี้ มะเร็งอาจกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ต่อมท่อน้ำเหลืองบริเวณคอ ปอด ตับ และกระดูก เป็นต้น