

มะเร็ง โพรงหลังจมูก



มะเร็งโพรงหลังจมูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข





มะเร็งโพรงหลังจมูก

เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนเชื้อสายจีน
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ปัจจัยเสี่ยง

1. มีประวัติญาติสายตรง ได้แก่ พี่น้อง บิดา มารดา เป็นมะเร็งโพรงหลังจมูก
2. มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตน์บาร์
3. การรับประทานอาหารที่มีไนโตรซามีนเป็นประจำ อาหารที่มีไนโตรซามีนสูง ได้แก่ ผักดอง ปลาเค็ม อาหารที่ใส่ดินประสิว เช่น กุนเชียง แหนม ไส้กรอก แฮม เบคอน



อาการ

1. หูอื้อ
2. มีก้อนที่คอ
3. คัดจมูก มีเสมหะปนเลือด
4. ปวดศีรษะเรื้อรัง
5. ตามองเห็นภาพซ้อน



มะเร็ง โพรงหลังจมูก

การวินิจฉัย

- จากการตรวจพบรอยโรคโดยการตรวจโพรงหลังจมูก หรือการส่องกล้องตรวจในโพรงหลังจมูก และทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลังจากการวินิจฉัย เพื่อประเมินระยะของโรค ร่วมกับการตรวจเลือด และเอกซเรย์ปอด



การรักษา

- รังสีรักษา
- เคมีบำบัด
- การรักษาแบบผสมผสาน

การรักษาจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของโรค และ
สภาวะของผู้ป่วย

การเตรียมความพร้อม

ผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูกจะได้รับคำแนะนำให้ตรวจ
สุขภาพช่องปากก่อนการฉายรังสีรักษา เพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก ระหว่างและหลังการฉาย
รังสีรักษา



“

หากมีอาการที่สงสัย
หรืออยู่ในครอบครัวที่มีผู้ป่วย
เป็นมะเร็งโพรงหลังจมูก
ควรพบแพทย์ทาง หู คอ จมูก
เพื่อค้นหาว่าเป็นมะเร็งโพรงหลังจมูกหรือไม่

”



สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2354 7025